


Epidémiologie des conduites addictives en Lorraine

(tabac, alcool, drogues illicites)

ORSAS - Lorraine

Commission Régionale des Addictions de Lorraine 19 janvier 2010



DROGUES ILLICITES

Consommation déclarée de cannabis par les élèves de 15 ans en Lorraine en 2007

15 ans [%]

Usage de cannabis au cours des 12 derniers mois

	2007	2002	Différence significative 2007
Garçons	21,0 %	34,6 %	
Filles	15,0 %	33,5 %	
G & F	17,0 %	34,1 %	Bassin houiller 10,5 %

Usage de cannabis au cours de la vie

	2007	2002	Différence significative 2007
G + F	23,6 %	38,3 %	Bassin houiller 17,5 %

Source : Enquête HBSC
Rectorat, ESP Nancy
ORSAS pour l'exploitation par territoire

Consommation déclarée de cannabis par les élèves de 15 ans en Lorraine (2007) et dans différents pays (2006)

15 ans [%]

	Garçons	Filles	
Au cours des trente derniers jours	Espagne	15	15
	Pays-Bas	15	10
	France	14	11
	Suisse	13	11
	Luxembourg	13	7
	Belgique (F)	12	9
	Lorraine	12	7
	Italie	11	9
	Grande-Bretagne	10	8
	Allemagne	6	4

Source : Enquête HBSC Lorraine (2007) France (2006)

Consommation déclarée de cannabis par les adolescents de 17 ans en Lorraine (2008)

17 ans [%]

Année 2008	Lorraine			Métropole
	G	F	G+F	G+F
Expérimentation (>=1 fois dans la vie)	38	32	35	42
Usage régulier (>= 10 fois dans le mois)	7	2	5	7


Comparaison 2008 - 2005 G + F	Lorraine		Métropole	
	2008	2005	2008	2005
Expérimentation (>=1 fois dans la vie)	35	48	42	49
Usage régulier (>= 10 fois dans le mois)	5	11	7	11

Source : Enquête ESCAPAD (2008 et 2005), OFDT

Consommation déclarée de cannabis par les adolescents de 17 ans en Lorraine et dans les autres régions (2008)

17 ans [%] Garçons et Filles

2008



Source : Enquête ESCAPAD (2008), OFDT

Consommation déclarée d'autres produits psychoactifs illicites par les adolescents de 17 ans en Lorraine (2008)


17 ans [%]

	Lorraine					Métropole	
	2008		2005			2008	2005
	G	F	GF	GF		GF	GF
Poppers	10	10	10	4 ↗		14	6
Ecstasy	3	1	2	4 ↘		3	4
Cocaïne	3	2	2	3 →		3	3
Héroïne	2	1	1	1 →		1	1

Source : Enquête ESCAPAD (2008), OFDT

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois

Source : Baromètre santé Lorraine 2005 - INPES - École de santé publique Nancy



Consommations déclarées de drogues au cours des 12 derniers mois à 18 à 39 ans en Lorraine en 2005

Cannabis	9,6 %	Val de Lorraine +++ , Nancy ++
Cocaïne, crack, free base	0,6 %	Sarrebourg, Saulnois ++
Héroïne	0,4 %	Sarrebourg, Saulnois ++
Amphétamines ou speed	0,9 %	
Analgésiques à base d'opiacées	0,5 %	Barrois, Val de Meuse ++
Hallucinogènes	0,8 %	
Inhalants	0,5 %	

Source : Enquête en santé mentale Lorraine 2005

Usage problématique de drogues illicites (hors cannabis)


Estimation de la prévalence de l'usage problématique de drogues (UPD) sur l'agglomération de Metz en 2005-2006

	chez les 15-64 ans			estimation du nombre d'UPD	
	Taux pour mille	Intervalle de confiance 95 %		Nombre	Intervalle de confiance 95 %
Metz	10,8	8,2	15,0	2 300	1 700 - 3 200
Lille	10,8	8,7	14,0	7 900	6 300 - 10 200
Marseille	10,2	7,7	14,2	5 600	4 200 - 7 700
Rennes	7,6	5,4	11,6	1 500	1 100 - 2 300
Toulouse	10,1	8,1	12,9	5 400	4 300 - 6 900
Lyon	10,7	8,0	14,8	8 400	6 300 - 11 800

Source : OFDT
Voir Tendances n° 69, Décembre 2009

Évolution du nombre d'ILS pour usage simple de cannabis

pour 100 000 habitants de 15 à 39 ans




Source : OCRTIS

Évolution du nombre d'ILS pour usage simple d'héroïne

pour 100 000 habitants de 20 à 39 ans



Évolution du nombre d'ILS pour usage simple de cocaïne pour 100 000 habitants de 20 à 39 ans



Source : OCRTIS

Interpellations pour usage simple de produit illicite - 2007

Nombre d'ILS pour 100 000 habitants de 20 à 39 ans
(cannabis : pour 100 000 de 15 à 39 ans)

	Cannabis	Héroïne	Cocaïne
Meurthe-et-Moselle	436	255	22
Meuse	451	179	56
Moselle	304	174	97
Vosges	272	129	13
Lorraine	354	194	57
France métropolitaine	469	38	23

Source : OCRTIS 2007


Estimation du nombre de personnes

recevant un traitement de substitution (Subutex® 8 mg, Méthadone 60 mg)



Estimation du taux de personnes pour 10 000 âgés de 20 à 39 ans


recevant un traitement de substitution (Subutex® 8 mg, Méthadone 60 mg) - Lorraine, France



Sources : InVS (SIAMOIS), OFDT Exploitation : ORSAS

Conséquences sanitaires


Nombre annuel de décès par surdose



Conséquences sanitaires

Répartition (%) des cas de sida déclarés en fonction du mode de contamination

Lorraine - France



Sources : InVS



ALCOOL

Consommation déclarée de boissons alcoolisées par les adolescents de 17 ans en Lorraine (2008)

17 ans [%]

Année 2008	Lorraine		Métropole	
	G	F	G+F	G+F
Usage régulier d'alcool (>=10 fois / mois)	10	3	7	9
Épisodes répétés sévères* (>= 3 fois / mois)	23	10	17	20
Ivresse répétée (>= 3 fois / an)	28	16	22	26

Comparaison 2008 - 2005 G + F	Lorraine		Métropole	
	2008	2005	2008	2005
Usage régulier d'alcool (>=10 fois / mois)	7	11	9	12
Épisodes répétés sévères* (>= 3 fois / mois)	17	16	20	18
Ivresse répétée (>= 3 fois / an)	22	25	26	26


*5 verres et plus en une seule occasion au moins trois fois au cours des 30 derniers jours

Source : Enquête ESCAPAD (2008 et 2005), OFDT


Consommation déclarée de boissons alcoolisées par les adolescents de 17 ans en Lorraine (2008)

17 ans [%]

Usage régulier d'alcool
(≥ 10 fois / mois)




Ivresse répétée (≥ 3 fois / an)




Consommateurs quotidiens d'alcool par âge et par sexe


Source : Baromètre santé Lorraine 2005 - INPES - École de santé publique Nancy



Proportion de personnes déclarant au moins une ivresse au cours des 12 derniers mois - Lorraine 2005




Proportion de consommateurs quotidiens d'alcool entre 15 et 75 ans en 2005



Conséquences sur la santé


Taux comparatif d'hospitalisation en court séjour pour éthylisme et troubles mentaux organiques et neuropathies liés à l'alcool en 2005-2007 par TSP (Taux pour 100 000 habitants tous âges)



Source : ATIH (PMSI)


Conséquences sur la santé

Taux comparatif d'hospitalisation en 2005-2007 par TSP (Hommes et Femmes) - Taux pour 100 000 habitants



Conséquences sur la santé


Taux comparatif de mortalité pour l'ensemble des trois principales causes de décès liées à l'alcool en 2003-2005 par région – Taux pour 100 000 habitants



Mortalité liée à l'alcool

Taux comparatif de mortalité par maladies liées à l'alcool - Hommes et Femmes


Taux pour 100 000 habitants 2003-2005



Mortalité liée à l'alcool

Taux comparatif de mortalité par maladies liées à l'alcool - Hommes

Taux pour 100 000 habitants 2003-2005




Mortalité liée à l'usage de l'alcool :
Psychoses alcooliques
+ Cirrheses
+ Tumeurs vads

Lorraine : 61
France : 58

Mortalité liée à l'alcool

Taux comparatif de mortalité par maladies liées à l'alcool - Femmes

Taux pour 100 000 habitants 2003-2005



Mortalité liée à l'usage de l'alcool :
Psychoses alcooliques
+ Cirrheses
+ Tumeurs vads

Lorraine : 13
France : 13



TABAC

Évolution du nombre de cigarettes vendues annuellement par habitant âgé de 15 ans ou plus
Source : CDIT



Usage déclaré de tabac par les élèves de 11, 13 et 15 ans en Lorraine 2002 et 2006

	Consommation répétée		Consommation quotidienne		
	2002	2007	2002	2007	
Garçons	11 ans	1,2 %	0,7 %	1,0 %	0,6 %
	13 ans	5,3 %	1,7 %	4,2 %	3,2 %
	15 ans	4,6 %	3,0 %	21,9 %	15,5 %
Filles	11 ans	1,3 %	0,4 %	0,6 %	-
	13 ans	6,7 %	3,0 %	5,6 %	6,4 %
	15 ans	4,5 %	2,5 %	28,2 %	15,5 %
G & F	11 ans	1,2 %	0,6 %	0,8 %	0,3 %
	13 ans	6,0 %	2,3 %	4,9 %	4,8 %
	15 ans	4,5 %	3,0 %	25,0 %	15,5 %

Répété : Au moins une cigarette par semaine mais moins d'une par jour

Source : Enquête HBSC
Rectorat, ESP Nancy
ORSAS pour l'exploitation par territoire


Usage quotidien de tabac à 17 ans (>= 1 cig. par jour)

17 ans [%]

	Lorraine		
	2003	2005	2008
Garçons	41	33	29
Filles	38	33	28
G & F	40	33	29


Source : Enquête ESCAPAD (2008 et 2005), OFDT

Proportion de fumeurs quotidiens entre 15 et 75 ans par région en 2005



Source : Baromètre Santé 2005 (INPES)

Fumeurs réguliers (au moins 1 cigarette par jour) Baromètre santé 2005 - INPES et École de Santé Publique de Nancy




Tabagisme important : proportion de consultants des centres d'examen de santé âgés de plus de 20 ans déclarant une consommation > 20 cigarettes par jour (2003)

Taux standardisés sur l'âge et la CSP

Hommes Lorraine : 6,2 %

Femmes Lorraine : 2,5 %



Source : CMP Vandoeuvre

Dépense annuelle moyenne par ménage - Achat de tabac

selon la CSP de la personne de référence 2006 France métropolitaine




Source : INSEE, Enquête budget des familles 2006

Conséquences sur la santé


Taux comparatifs
d'hospitalisation
pour une pathologie
liée au tabac en 2005-2007
Taux pour 100 000 hab.

Bronchites chroniques
et maladies pulmonaires obstructives
+ tumeurs de la trachée, des bronches
et du poumon + tumeurs VADS
+ cardiopathies ischémiques



Conséquences sur la santé

Taux comparatifs
d'hospitalisation
pour bronchite chronique
et maladie pulmonaire
obstructive en 2005-2007
Taux pour 100 000 hab.




Mortalité liée au tabac

Taux comparatifs de mortalité liée au tabac* en 2003-2005 Taux pour 100 000

Mortalité liée à l'usage du tabac :
Bronchites chroniques
et maladies pulmonaires obstructives
+ tumeurs de la trachée, des bronches
et du poumon + tumeurs VADS
+ cardiopathies ischémiques

Hommes et Femmes



Mortalité liée au tabac

Taux comparatifs de mortalité liée au tabac* en 2003-2005 Taux pour 100 000

Mortalité liée à l'usage du tabac :
Bronchites chroniques
et maladies pulmonaires obstructives
+ tumeurs de la trachée, des bronches
et du poumon + tumeurs VADS
+ cardiopathies ischémiques

Hommes et Femmes

